

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι διενεργεί κατά την παρούσα περίοδο εργασίες υλοτομίας των νεκρών δένδρων τραχείας πεύκης που βρίσκονται εντός του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης. Κατά την τελευταία διετία παρατηρήθηκε η εμφάνιση νεκρών ατόμων πεύκης μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες. Όπως διαπιστώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, η νέκρωση οφείλεται σε έντονη προσβολή της πεύκης από φλοιφάγα έντομα που ενδημούν στο περιαστικό δάσος, με κυριαρχούντα τα είδη *Orthotomicus erosus*, *Tomicus piniperda* (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae).

Το φαινόμενο είναι σύνηθες στα δάση πεύκης. Ο μοναδικός τρόπος περιορισμού είναι η έγκαιρη απομάκρυνση των προσβεβλημένων δένδρων ώστε να περιοριστεί δραστικά το πληθυσμιακό δυναμικό των εντόμων. Καταλληλότερη χρονική περίοδος επέμβασης σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, κρίνεται η περίοδος πριν την άνοιξη, καθώς αυτούς τους μήνες τα έντομα βρίσκονται κάτω από τον φλοιό, οπότε η απομάκρυνση των προσβεβλημένων δένδρων θα οδηγήσει και στην μείωση του πληθυσμού των εντόμων.

- [Δελτίο Τύπου](#)